

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

FOA har i perioden 22. marts - 8. april 2013 gennemført en undersøgelse om MRSA gennem forbundets elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen. Spørgsmålene vedrørende MRSA var en del af en større undersøgelse, hvor 2.494 medlemmer deltog helt eller delvist. Undersøgelsen havde en svarprocent på 59. I den del af undersøgelsen, der omhandlede MRSA, deltog kun medlemmer der arbejder som social- og sundhedspersonale, hvilket var 1.551.

Undersøgelsens hovedkonklusioner følger her:


- Mere end 4 ud af 10 medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, har i ringe grad eller slet ikke den tilstrækkelige viden om MRSA til at opdage symptomer hos borgerne.
- 6 ud af 10 føler sig rustet til at pleje borgere med MRSA. Kigger man specifikt på hjemmeplejen, er det kun 5 ud af 10.
- 6 ud af 10 medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale føler, at de har tilstrækkelig viden om de forholdsregler om hygiejne mv., som de skal tage i tilfælde af MRSA
- Mere end hvert tredje, der arbejder som social- og sundhedspersonale medlem har plejet en borger med MRSA inden for de seneste 2 år.
- Hvert femte medlem, som har plejet en borger med MRSA inden for de seneste 2 år, vurderer, at hygiejnen, herunder rengøringen, var utilstrækkelig. 3 ud af 4 mente til gengæld, at hygiejnen i høj eller nogen grad var tilstrækkelig.

Svarene uddybes på de følgende sider.

Mere end 4 ud af 10 har i ringe grad eller slet ikke den tilstrækkelige viden om MRSA til at opdage symptomer hos borgerne

45 procent svarer, at de i ringe grad eller slet ikke har tilstrækkelig viden om MRSA til at opdage symptomer hos borgerne. Kun 16 procent svarer, at de i høj grad har tilstrækkelig med viden om MRSA.

Figur 1. I hvilken grad har du tilstrækkelig viden om MRSA til at opdage symptomer hos borgerne, fx bylder?




Svar: 1.442

Anm. Medlemmer, der har svaret "Ved ikke" til spørgsmålet, er udeladt af figuren.

6 ud af 10 føler sig rustet til at pleje borgere med MRSA

Medlemmerne blev også spurgt, om de generelt følte sig tilstrækkeligt rustede til at pleje borgere med MRSA. Svarene ligger tæt på svarfordelingen i figuren ovenfor om end lidt flere - knap 6 ud af 10 føler sig rustet i nogen eller høj grad.

Figur 2. I hvilken grad føler du dig tilstrækkeligt rustet til at pleje borgere med MRSA?




Svar: 1.420

Anm. Medlemmer, der har svaret "Ved ikke" til spørgsmålet, er udeladt af figuren.

Slår man kategorierne sammen parvis og sammenligner medlemmer, der er ansat i hjemmeplejen med medlemmer, der er ansat andre steder (fx plejehjem eller sygehuse), ser man markante forskelle. Sammenligningen fremgår af figur 3 nedenfor.

Figur 3. I hvilken grad føler du dig tilstrækkeligt rustet til at pleje borgere med MRSA?



Svar: 1.420

Anm. Medlemmer, der har svaret "Ved ikke" til spørgsmålet, er udeladt af figuren.


Der er en forskel på 10 procentpoints mellem medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen sammenlignet med medlemmer, der arbejder uden for hjemmeplejen. Medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, føler sig markant dårligere rustet til at pleje borgere med MRSA end medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale andre steder (fx plejehjem eller sygehuse).

Blandt de medlemmer, der arbejder på sygehuse, er andelen af medlemmer som i høj eller nogen grad føler sig tilstrækkeligt rustet til at pleje borgere med MRSA oppe på omkring 8 ud af 10.

6 ud af 10 medlemmer føler, at de har tilstrækkelig viden om de forholdsregler om hygiejne mv., som de skal tage i tilfælde af MRSA

27 procent af medlemmerne svarer, at de i høj grad føler, at de har tilstrækkelig viden om MRSA, mens 38 procent svarer "I nogen grad". Lidt over en femtedel svarer "I ringe grad", mens 12 procent svarer, at de slet ikke har tilstrækkelig viden om hygiejneforholdsregler i forbindelse med MRSA.

Figur 4. Føler du, at du har tilstrækkelig viden om de forholdsregler om hygiejne mv., som du og dine kolleger skal tage i tilfælde af MRSA?




Svar: 1.448

Anm. Medlemmer, der har svaret "Ved ikke" til spørgsmålet, er udeladt af figuren.

Mere end hvert tredje medlem har plejet en borger med MRSA inden for de seneste 2 år

35 procent af medlemmerne har behandlet en borger med MRSA inden for de seneste 2 år. 53 procent har ikke. 13 procent har svaret "Ved ikke/husker ikke".

Figur 5. Har du inden for de sidste 2 år plejet en borger med MRSA?




Svar: 1.486

Hvert femte medlem, som har plejet en borger med MRSA inden for de seneste 2 år, vurderer, at hygiejnen, herunder rengøringen, var utilstrækkelig

De medlemmer, der svarede, at de havde plejet en borger med MRSA inden for de seneste 2 år, blev efterfølgende spurgt, om hygiejnen og rengøringen var tilstrækkelig. Knap 4 ud af 10 svarede "I høj grad", og lige så mange svarede "I nogen grad". Lidt mere end hver sjette fandt hygiejneniveauet ringe, mens kun 1 procent svarede, at det slet ikke var tilstrækkeligt.

Figur 6. Tænk venligst på den borger med MRSA, som du senest har plejet. I hvilken grad var hygiejnen, herunder rengøringen, tilstrækkelig i forbindelse med dette tilfælde af MRSA?




Svar: 513

Anm. Spørgsmålet blev kun stillet til de medlemmer, der havde svaret "Ja" i det foregående spørgsmål (Har du inden for de sidste 2 år plejet en borger med MRSA?)

Det er især medlemmer, der arbejder i ældreplejen (hjemmeplejen og plejehjem), som har oplevet utilstrækkelig hygiejne i forbindelse med pleje af borgere med MRSA. I figur 7 nedenfor er kategorierne slået sammen parvis og "Ved ikke" er udeladt.

Figur 7. Tænk venligst på den borger med MRSA, som du senest har plejet. I hvilken grad var hygiejnen, herunder rengøringen, tilstrækkelig i forbindelse med dette tilfælde af MRSA?



Svar: 487

Anm. Medlemmer, der har svaret "Ved ikke" til spørgsmålet, er udeladt af figuren.

Anm. Spørgsmålet blev kun stillet til de medlemmer, der havde svaret "Ja" i det foregående spørgsmål (Har du inden for de sidste 2 år plejet en borger med MRSA?)

Der er en forskel på 10 procentpoints mellem medlemmer, der arbejder på plejehjem og i hjemmeplejen sammenlignet med medlemmer, der arbejder andre steder. Andelen, der har oplevet utilstrækkelig rengøring, er således væsentligt større i ældreplejen end uden for ældreplejen.

Blandt de medlemmer, der arbejder på sygehuse, er andelen af medlemmer som har oplevet utilstrækkelig hygiejne i forbindelse med MRSA på under 5 procent.

Store forskelle på, hvor meget den enkelte arbejdsplads gør ud af særlige forholdsregler i forbindelse med MRSA

De medlemmer, der svarede, at de inden for de seneste 2 år havde plejet en borger med MRSA, blev efterfølgende bedt om at uddybe deres svar i et åbent kommentarfelt om hygiejnen i forbindelse med den seneste borger med MRSA, de havde plejet. Den mulighed benyttede 249 ud af 513 medlemmer sig af.

Af disse åbne kommentarer fremgår det, at det er meget forskelligt, hvor meget der bliver gjort ud af de særlige forholdsregler i forbindelse med MRSA. Langt de fleste kommentarer er positive og i stil med nedenstående:

"Jeg er social- og sundhedsassistent på en operationsgang, hvor der er en høj standard i forhold til hygiejnen. Jeg bruger PRI-dokumenter til at holde mig underrettet. Vi snakker om MRSA-patienter inden de bliver modtaget på operationsstuen og personalet er forberedt i forvejen og er klar til at modtage og pleje patienten."

Der er dog også medlemmer, der har oplevet kritisable forhold. Nogle medlemmer angiver manglende tid som årsagen:

"Der var ikke tid til at skifte tøj, og der var uenighed mellem de ansvarlige om i hvor høj grad, plejepersonalet fx skulle beskytte sit tøj"

Andre nævner manglende viden som et problem:

"Manglende information om retningslinjer samt for sen information fra læge om, at det var det problem, vi havde."

Endelig peger medlemmerne også på de pårørende som en hygiejnemæssig udfordring:

"De pårørende tog ikke så meget hensyn til hygiejnen. Sådan en patient burde plejes på et hospital, og ikke et plejecenter."

Undersøgelsens metode

FOA-undersøgelsen om MRSA er gennemført i perioden 22. marts - 8. april 2013 ved en spørgeskemaundersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel.

Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet – er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv.

De spørgsmål, der er afrapporteret i dette notat, er blevet stillet til medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale¹. Der er tale om erhvervsaktive medlemmer ekskl. elever. Undersøgelsen var en del af en større undersøgelse, der også indeholdt andre emner (tidsregistrering, besparelser i den offentlige sektor mm.).

I alt blev 4.279 medlemmer inviteret til undersøgelsen. 82 e-mail-adresser var uvirksomme, så det reelle antal inviterede var 4.197 medlemmer. 2.494 medlemmer har besvaret hele eller dele af det spørgeskema, der har været stillet til dem. Det giver en svarprocent på 59. 58 procent har gennemført undersøgelsen fuldt ud. Svarprocenten ligger på linje med svarprocenten i andre undersøgelser via medlemspanelet. I dette notat indgår svar fra 1.551 erhvervsaktive FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale. Svarene fra ikke-fuldt gennemførte interviews er inkluderet i analysen.

¹ Ved social og sundhedspersonale forstås faggrupperne: Beskæftigelsesvejledere, hjemmehjælpere, plejere, plejehjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere.